


Una bocca migliore con Caphosol®†



Utilizzare quotidianamente Caphosol® collutorio prima e durante il trattamento oncologico aiuta a prevenire la mucosite orale e la cura quando si è già manifestata.

Caphosol®	
Che cos'è?	<p>Caphosol® è un collutorio ricco di ioni calcio e fosfato. Agisce attraverso la lubrificazione della bocca e rende gli alimenti più facili da ingoiare¹</p> <ul style="list-style-type: none">• Caphosol® è l'unico collutorio scientificamente testato che aiuta a prevenire e ridurre la durata e il dolore della mucosite orale^{1,2}• Utilizzare Caphosol® prima di iniziare il trattamento oncologico può ridurre la gravità della mucosite orale o prevenirne l'insorgenza¹
Con che frequenza devo utilizzarlo?	All'inizio del trattamento oncologico Caphosol® va utilizzato tra le 4 e le 10 volte al giorno, se il dolore dovesse aggravarsi
Ha effetti secondari?	Gli effetti secondari verificati con l'uso di Caphosol® sono stati rari e generalmente leggeri
Che cosa devo fare se ingoio accidentalmente	Non si preoccupi. Non è prevista l'insorgenza di nessun effetto pericoloso in caso di ingestione accidentale di Caphosol® ³
Posso mangiare subito dopo aver	Si dovrà evitare di ingerire cibi e liquidi per almeno 15 minuti dopo gli sciacqui con Caphosol®
Produco più saliva se utilizzo	No, Caphosol® non stimola la produzione di saliva
Dove posso ottenerlo?	Chieda al suo medico o all'infermiera una ricetta di Caphosol® oppure lo acquisti online qualora sia disponibile. Per ordinare Caphosol® basta andare sul sito www.caphosol.eu .

†Caphosol® è indicato come coadiuvante nelle cure orali standard, per la prevenzione e il trattamento della mucosite che può essere provocata da radioterapia o chemioterapia.

Per ulteriori informazioni su Caphosol® basta andare sul sito http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp

Caphosol®

Come devo utilizzare Caphosol®?

Caphosol® è molto facile da usare. Si presenta in due fiale di colori diversi, che vanno miscelate prima degli sciacqui³

- Caphosol® può essere utilizzato contemporaneamente ad altri trattamenti, giacché non è nota alcuna interferenza di Caphosol® con altre terapie³
- Caphosol® può essere usato tra le 4 e le 10 volte al giorno, a seconda dello stato della bocca³
- Sono da evitare l'uso di altri colluttori e l'ingestione di cibi e liquidi per almeno 15 minuti dopo gli sciacqui con Caphosol®³

1 Miscelare il contenuto delle due fiale in un bicchiere*



2 Fare sciacqui con metà del liquido per almeno un minuto



3 Sputare il prodotto



4 Fare sciacqui nuovamente con l'altra metà del prodotto, per almeno un altro minuto



5 Sputare il liquido ed ecco fatto!



*Le fiale non devono essere versate nel bicchiere contemporaneamente.

Per ulteriori informazioni sulla mucosite orale e su come controllarla, parlare con il medico o l'infermiera e leggere gli altri fogli di sintesi dei dati disponibili sul sito www.mouthsmadegood.com

Bibliografia:

1. Papas AS *et al.* *Bone Marrow Transplant* 2003;**31**:705–712. 2. Haas M *et al.* 50th ASTRO congress 2008; abstract 2530. 3. Caphosol® IFU. EUSA Pharma (Europe) Limited, November 2008.